Kod	**Oznaczenie**	**Metoda**	**Analizator**	**Materiał**	**Wartości Referencyjne**	**Czas oczekiwania na wynik**	**% błędu**
L47.103.1134	**B-HCG**	Immunofluorescencja FIA	Aqt 90 Radiometer	Krew pobrana na EDTA	**< 2 mlU/ml** **3 tydzień ciąży** **5.8 – 71.2 mIU/ml** **4 tydzień ciąży** **9.5 – 750 mIU/ml** **5 tydzień ciąży** **217 – 7138 mIU/ml** **6 tydzień ciąży** **158 – 31795 mIU/ml** **7 tydzień ciąży** **3697 – 163563 mIU/ml** **8 tydzień ciąży** **32065 – 149571 mIU/ml** **10 tydzień ciąży** **46509 – 186977 mIU/ml** **12 tydzień ciąży** **27832 – 210612 mIU/ml** **kobiety przed menopauzą** **< 1 mIU/ml** **kobiety po menopauzie** **< 7 mIU/ml**	**do 1 godz.**	**10 %**
O59.103.1134	**Troponina I**	Immunofluorescencja FIA	Aqt 90 Radiometer	Krew pobrana na EDTA	**< 0.023 µg/l**	**do 1 godz.**	**10 %**

I81.103,1134	**CRP**	Immunofluorescencja FIA	Aqt 90 Radiometer	Krew pobrana na EDTA	**< 5 mg/l**	**do 1 godz.**	**10 %**
M19.103.1134	**CK-MB MASS**	Immunofluorescencja FIA	Aqt 90 Radiometer	Krew pobrana na EDTA	**< 7.6 ng/ml**	**do 1 godz.**	**10 %**
N24.103.1134	**NTproBNP**	Immunofluorescencja FIA	Aqt 90 Radiometer	Krew pobrana na EDTA	**< 134 pg/ml**	**do 1 godz.**	**10 %**
G49.103.1134	**D-DIMERY**	Immunofluorescencja FIA	Aqt 90 Radiometer	Krew pobrana na EDTA	**< 0.584 mg/l**	**do 1 godz.**	**10 %**
G85.102.17	**TROMBO-LASTOMETRIA**	Trombolastometryczna	Rotem Sigma	Krew pobrana na cytrynian sodu	**Wynik w formie graficznej**	**90 min**	**10 %**
PARAMETRY KRYTYCZNE							
Kod	**Oznaczenie**	**Metoda**	**Analizator**	**Materiał**	**Wartości referencyjne**	**Czas oczekiwania na wynik**	**% błędu**
O29.105.065.1	**pH**	Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody wodorowej	ABL 835 flex	**Do badań gazometrycznych do krwi zaleca się używanie krwi tętniczej pobranej z tętnicy promieniowej, udowej lub ramiennej. Próbki krwi powinny być pobierane do strzykawek heparynizowanych. Natychmiast po pobraniu należy ze strzykawki usunąć powietrze, zamknąć szczelnie i dokładnie wymieszać próbkę (przez delikatne odwracanie), aby uniknąć utworzenia się skrzepu**	**♀ 7.380 – 7.420 ♂ 7.360 – 7.420**	**Do 5 min**	**10 %**
	pCO_2	*Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody CO_2 i wodorowej*			**♀/♂ 35 - 48 mm Hg**		
	THB	Oxymetryczna			**♀ 12.0 – 16.0 g/dl ♂ 13.5 – 17.5 g/dl**		
	HCT	Oxymetryczna			**♀ 34.0 – 44.0 % ♂ 36.0 – 50.0 %**		
	COHB	Oxymetryczna			♀/♂		

					0.5 – 1.5 %		
	METHB	Oxymetryczna			♀/♂ **0.0 – 1.5 %**		
	K	*Elektroda jono -selektywna*			♀/♂ **3.5 – 5.0 mmol/l**		
	Na	*Elektroda jono -selektywna*			♀/♂ **36.0 – 146.0 mmol/l**		
	CA zjonizowany**	*Elektroda jono -selektywna*			♀/♂ **1.15 – 1.29 mmol/l**		
	Cl	*Elektroda jono -selektywna*			♀/♂ **98.0 – 106.0 mmol/l**		
	Glu				♀/♂ **3.9 – 5.8 mmol/l**		
	Lac				♀/♂ **0.5 – 1.6 mmol/l**		
	Crea				♀/♂ **44.0 – 124.0 µmol/l**		
	TBil				♀/♂ **1.0 – 17.0 µmol/l**		