



SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE

I-P-ZM-02/K2

Skrócona instrukcja dla pacjenta

Plwocina.

1. Plwocinę należy pobrać:
 - rano, bezpośrednio po przebudzeniu;
 - na czczo po uprzednim umyciu zębów oraz przepłukaniu jamy ustnej i gardła przygotowaną letnią wodą;
 - przed przyjęciem jakichkolwiek leków;
 - w przypadku trudności z odkrztuszaniem dopuszczalne jest przyjęcie wcześniej stosowanego środka rozrzedzającego.
2. Należy przygotować sterylny, plastikowy pojemnik o szerokiej szyi otrzymany z Zakładu Mikrobiologii.
3. Pojemnik należy opisać imieniem i nazwiskiem w miejscu do tego przeznaczonym przy użyciu niezmywalnego pisaka.
4. Pojemnik należy otworzyć bezpośrednio przed pobraniem wyłącznie na czas napełniania materiałem.
5. Plwocinę należy pobrać z głębokiego odkrztuszania (**nie wolno słuwać do pojemnika**) w ilości co najmniej 1 ml do przygotowanego wcześniej pojemnika.
6. Po pobraniu należy pojemnik szczelnie zamknąć nie dotykając brzegów ani wewnętrznej strony nakrętki
7. Pobrany materiał należy w czasie do 2 godzin dostarczyć do punktu pobrań.

PL 31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 36,
tel. +(48) 12 424 70 01, fax. +(48) 12 424 74 87
www.su.krakow.pl

