



SZPITAL UNIWERSYTECKI  
W KRAKOWIE

I-P-ZM-02/K5

## Skrócona instrukcja dla pacjenta

### **Wymaz okołodbytniczy w kierunku owsicy — bagietka z celofanem — wymazówka parazytologiczna.**

1. Materiał najlepiej pobrać między godziną 22:00-23:00 w nocy lub rano, zaraz po przebudzeniu przed poranną toaletą i przed wypróżnieniem – najlepiej po spoczynku nocnym.
2. Wykonać wymaz przy użyciu specjalnego zestawu tzw. „wymazówki parazytologicznej” dostępnej w Zakładzie Mikrobiologii.
3. Wyjąć bagietkę z pojemnika i koniec z celofanem zwilżyć letnią, przegotowaną wodą, tak aby lekko zwilżyć celofan. Nie zdejmować celofanu z bagietki!.
4. Bagietkę wziąć do jednej ręki, a drugą ręką rozchylić fałdy odbytu. Końcem bagietki z celofanem wymazać śluzówkę odbytu i fałdy skóry otaczające odbyt. Nie wkładać bagietki do środka odbytnicy.
5. Bagietkę z celofanem włożyć do pojemnika nie dotykając ścian naczynia. Pojemnik szczelnie zamknąć.
6. Pobrany materiał podpisać danymi pacjenta i dostarczyć do Punktu Pobrań w czasie do 2 godzin.

PL 31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 36,  
tel. +(48) 12 424 70 01, fax. +(48) 12 424 74 87  
[www.su.krakow.pl](http://www.su.krakow.pl)

